Stylo prérempli AMGEVITA® SureClick® à usage unique

Instructions pour l'auto-injection sous-cutanée

Le stylo prérempli SureClick® vous permet de procéder vous-même à l'injection d'AMGEVITA® à domicile.

Important :
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant très exactement les indications de votre médecin ou du personnel médical. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien(ne).

Avant de procéder à l'injection, veillez à respecter les consignes suivantes :

- ✓ Ne procédez à l'injection que si votre médecin ou le personnel du cabinet vous a préalablement montré comment vous injecter le médicament.
- ✓ Conservez les stylos prérempli au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ne les congelez pas.
- ✓ N'utilisez pas le stylo prérempli s'il est tombé sur une surface dure. Même si aucun dommage n'est visible, des parties du stylo prérempli pourraient être cassées.
- ✓ Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau.

Préparez le matériel suivant :

- ✓ Un stylo prérempli neuf
- ✓ Un tampon imbibé d'alcool
- ✓ Un coton ou une gaze
- ✓ Un pansement
- ✓ Un conteneur à déchets tranchants

Étapes importantes de l'injection

Étape 1 : Sortez un stylo prérempli AMGEVITA de son emballage.

Sortez avec précaution et en tirant bien droit le stylo prérempli de la boîte 30 minutes avant l'injection pour lui permettre de revenir à température ambiante. Replacez l'emballage d'origine contenant les stylos préremplis AMGEVITA® inutilisés dans le réfrigérateur.

Veillez à ne jamais :

- remettre le stylo prérempli au réfrigérateur une fois qu'il a atteint la température ambiante ;
- réchauffer le stylo prérempli avec de l'eau chaude, au four à micro-ondes ou en l'exposant à la lumière directe du soleil ;
- secouer le stylo prérempli ;
- retirer trop tôt le capuchon jaune du stylo prérempli.



Étape 2 : Contrôlez le stylo prérempli AMGEVITA®.



Assurez-vous que le médicament visible dans la fenêtre est clair et incolore à légèrement jaune. Vérifiez la date de péremption.

N'utilisez pas le stylo prérempli si
- le médicament est trouble, présente une coloration anormale ou contient des flocons ;
- il présente des fissures ou des éléments cassés ;
- il est tombé sur une surface dure ;
- le capuchon jaune est manquant ou mal fixé ;
- la date de péremption imprimée sur l'étiquette est dépassée.

Dans de tels cas, jetez le stylo et utilisez-en un neuf.

Étape 3 : Préparez et nettoyez le site d'injection.



Choisissez l'endroit où vous allez pratiquer l'injection :
- **le ventre** (à l'exception d'une zone de 5 centimètres autour du nombril) ou
- **les cuisses**

Désinfectez la zone d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.
Vous pouvez alors pratiquer l'injection dès que la peau est sèche.

Important :
- Évitez de toucher à nouveau le site d'injection avant l'injection.
- Assurez-vous de ne pas injecter le médicament exactement au même endroit que la fois précédente.
- Évitez les zones où la peau est sensible ou présente une ecchymose, une rougeur ou une induration.
- Evitez d'injecter le médicament dans des zones comportant des cicatrices ou des vergetures.
- Si vous êtes atteint de psoriasis, évitez de pratiquer l'injection directement dans des zones où la peau est gonflée, épaisse, rouge ou squameuse, ou dans des lésions.

Étape 4 : Retirez le capuchon jaune en le tirant bien droit.



Ne retirez le capuchon jaune que lorsque vous êtes prêt(e) à procéder à l'injection (dans les 5 minutes tout au plus), car le médicament pourrait sécher. Tenez le stylo prérempli de manière à pouvoir voir la fenêtre. Tirez le capuchon jaune en le tirant bien droit. Vous devrez peut-être tirer fort. Il est normal d'apercevoir une goutte de médicament à l'extrémité de l'aiguille ou de la protection de couleur crème.

Veillez à ne jamais :
- tordre, plier ou secouer le bouchon jaune pour l'ôter.
- mettre votre doigt à l'intérieur de la protection de couleur crème.

Étape 5 : Préparez une surface ferme pour l'injection et positionnez le stylo prérempli.

Pincez la peau pour créer une surface ferme sur le site d'injection.

Placez la protection de couleur crème directement contre la peau.

Maintenez la peau pincée jusqu'à ce que l'injection soit terminée. Assurez-vous de pouvoir voir la fenêtre. Assurez-vous que l'auto-injecteur est placé bien droit sur le site d'injection (à un angle de 90°).



Étape 6 : Maintenez le stylo prérempli appliqué contre la peau.

Enfoncez-le fermement jusqu'à ce que la protection de couleur crème arrête de bouger.
Maintenez le stylo enfoncé ; ne le retirez pas.

La protection de couleur crème s'enfonce et déverrouille le bouton-poussoir bleu clair.

- Maintenez le stylo fermement enfoncé et appuyez sur le bouton-poussoir bleu clair pour démarrer l'injection.
- Vous pouvez alors entendre ou sentir un clic. La fenêtre commence à se colorer en jaune, vous pouvez à présent relâcher le bouton-poussoir bleu clair.



Étape 7 : Maintenez le stylo prérempli enfoncé contre la peau.

Lorsque la fenêtre est entièrement jaune, l'injection est terminée. L'injection peut prendre jusqu'à **10 secondes**.
Vous pouvez alors entendre ou sentir un clic.
Retirez le stylo prérempli de votre peau.
La protection de couleur crème se verrouille autour de l'aiguille.

Important :
Si, lorsque vous retirez le stylo prérempli de votre peau, vous notez que la fenêtre ne s'est pas colorée en jaune ou s'il vous semble que le médicament est encore en train d'être injecté, cela signifie que vous n'avez pas reçu une dose entière.
Dans ce cas, appelez immédiatement votre médecin ou un professionnel de santé.



Étape 8 : Après l'injection.

Après l'injection, placez immédiatement le stylo prérempli utilisé et le capuchon jaune dans le conteneur à déchets tranchants.
Ne jetez pas le stylo prérempli et le récipient à déchets tranchants avec les ordures ménagères et ne les recyclez pas.
Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien(ne) comment les éliminer de manière appropriée.



Important :
Ne réutilisez pas le stylo prérempli usagé et ne touchez pas la protection de couleur crème.
Gardez toujours le conteneur à déchets tranchants hors de portée des enfants.

Étape 9 : Contrôlez le site d'injection.

En cas de saignement au site d'injection, appuyez pendant quelques secondes un coton ou une gaze sur le saignement.
Ne frottez **jamais** le site d'injection. Si nécessaire, appliquez un pansement ou un petit bandage.

Veuillez consulter la notice pour de plus amples informations.

DEU-501-0724-80005

Amgen GmbH, 80992 Munich, Allemagne. © 2024 Amgen Inc. Tous droits réservés.

AMGEN Care